

INTRODUCCIÓN

El consumo de tabaco ha disminuido desde la introducción de la ley del tabaco. Sin embargo, la introducción de nuevos dispositivos en el mercado del tabaco, puede haber generado un cambio de tendencias en los consumidores.

OBJETIVO


Analizar las **tendencias temporales** de la población española que ha iniciado el **consumo de tabaco**, en función del grupo de edad.

METODOLOGÍA


- **Estudio longitudinal retrospectivo** de las Encuestas nacionales de salud (ENSE) desde 1996 a 2020.
- **Población:** pacientes encuestados por vía telefónica >18 años. Criterios de exclusión: encuestados con datos incompletos.
- **Variables:** inicio de consumo de tabaco, fumador (si/no), edad, año en el que se realiza la encuesta.
- **Análisis:** estudio de tendencias temporales mediante un modelo de regresión Joinpoint. Se consideró significativo un cambio de porcentaje anual (APC) con un error alfa <0.05.

RESULTADOS

Inicio de consumo entre 25 y 44 años



Inicio de consumo entre 45 y 64 años



El consumo de tabaco ha disminuido.
El inicio de consumo ha aumentado entre:

- 25-44 años (APC 1995-2020: 1.36)
- 45-64 (APC 2001-2020: 3.58)

CONCLUSIÓN

Se ha observado una disminución global del consumo de tabaco. Aun así, debido a un creciente inicio de consumo en las edades entre 25 y 65, se debe explorar en mayor profundidad los factores asociados y desarrollar estrategias específicas dirigidas a este rango de edad